


# Un pseudoescorpí icònic



La fauna subterrània o hipogea presenta una sèrie d'adaptacions morfològiques com la tendència a l'anoftàlmia (pèrdua d'ulls), la despigmentació i l'allargament dels apèndixs. També presenta interessants adaptacions fisiològiques com la reducció de descendència o l'alentiment del metabolisme.

L'alt grau d'adaptació d'aquestes espècies, però, les fa molt vulnerables als canvis del medi, sobretot per la pressió antròpica. Les seves àrees de distribució són molt reduïdes, tractant-se sovint d'endemismes i/o d'espècies relictas.



**Arachnida. Pseudoescorpiones. Bochicidae**  
***Troglobisium racovitzai*** (Ellingsen, 1912)

És una espècie endèmica de la península Ibèrica, present a diverses cavitats del nord de Castelló, Tarragona, i massís del Garraf. Citada com amenaçada al "Libro Rojo de los Invertebrados de España (LRIE)" amb la categoria de Vulnerable (Verdú *et al.* 2011). Espècie estrictament troglòbia i per tant molt ben adaptada al medi subterrani. Destaca per ser un dels pseudoescorpins més grans d'Europa. És depredador d'altres petits artròpodes subterranis.



L'hàbitat hipogeu és un espai molt fràgil on regna el silenci i la foscor absoluta. Hi som benvinguts sempre que respectem la vida d'aquests ambients que amaguen veritables tresors biològics.